

セアカゴケグモ にご注意を!!

「セアカゴケグモ」は、オーストラリア等熱帯～亜熱帯地域を原産地とする毒グモで、わが国では外来生物法で特定外来生物として指定されています。

香川県でも、平成21年9月以降、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、多度津町、まんのう町で発見されています（令和3年5月現在）。

「セアカゴケグモ」は、攻撃性もなくおとなしいクモですが、**毒を持っていて**、見つけても絶対に素手で捕まえないようにして、直ぐに市販の殺虫剤を噴霧するか、靴で踏みつぶして駆除してください。

また、セアカゴケグモは車などに付着して運ばれ、各地でも見つかる場合があると思われますので、発生していない地域でも十分注意してください。

■ 体の特徴

成体のメスは約7～10mmで、全体的に黒色又は濃い褐色です。

特に**腹部の背の部分に赤色の帯状の模様**があるのが特徴です。

成体のオスは約3.5～6mmで、腹部の背の部分に白い斑紋があります。

咬むのは主にメスでオスによる咬傷事例は無いと言われています。



メス

オス

■ 生息場所

「セアカゴケグモ」は、日本国内には生息していなかったクモですが、平成7年に大阪府高石市で初めて発見されて以降、これまで45都道府県で発見されています（令和2年7月現在）。

「セアカゴケグモ」は、日当たりが良く暖かいところや昆虫などの餌が豊富なところに生息しています。

例えば

- ・花壇まわりのブロックのくぼみや穴、植木鉢の下、ビニールハウスなど温室
- ・排水溝の側面やふた（グレーチング）の裏側
- ・クーラーなどの室外機や自動販売機との壁のすきま
- ・墓地の花立てや線香立てなどの石のすきま
- ・すべり台、ブランコ等遊具の裏側

などです。

■ 駆除方法

セアカゴケグモを見つけたら、**市販の殺虫剤（ピレスロイド系）を噴霧するか、靴で踏みつぶして駆除してください。**

卵（卵のう：卵の入っているふくろ）は、棒きれなどでクモの巣ごとからめ取り、その場で**焼却**するかビニール袋に入れて**完全に踏みつぶしてください**。（卵には殺虫剤の効果が薄いようです。）



在来のオオヒメグモなどは、セアカゴケグモと同じ「ヒメグモ科」のクモで、形が似ていることから間違いやさないので注意してください。
※形は似ていますが、赤い模様はありません。

卵のうの直径 6mm～11mm



■ 咬まれたときの対応

咬まれたときは**針で刺されたような痛み**を感じ、その後、咬まれたまわりが腫れ、赤くなります（痛みは次第に全身に広がることもあります）。直ちに傷口を水道水で洗い、患部を冷やしましょう（包帯や止血帯はしない方が良い）。悪化すると、全身症状（吐き気、さむけ等）が現れることがありますので、患部を冷やしながら、**※直ちに病院に行きましょう（乳幼児の場合は救急車を呼びましょう）。**

治療に関しては、お近くの医療機関までお問合せください。

※ 病院に、咬まれたクモを殺して、ビニール袋等に入れて持参してください。より適切な治療につながります。

■ 対策

- ・外で作業するときは、手袋をしましょう
- ・不用意に側溝等の隙間に手を入れないようにしましょう。
- ・クモの生息しそうな場所は、こまめに清掃したり整理整頓したりして、セアカゴケグモの住みにくい環境づくりをしましょう。



特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則禁止されています。詳細は、<http://www.env.go.jp/nature/intro/>

このチラシのダウンロードは、

https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/seaka_chuui.html

《連絡先》

香川県環境森林部 みどり保全課

電話：087-832-3227 FAX：087-806-0225

midorihozen@pref.kagawa.lg.jp